

²¹
n^o. 10 reçu le 2 janvier 1779
rejetté.

Envoi

Sur la question proposée par l'Académie Royale de
Chirurgie pour le prix de 1779.

Déterminer les règles diététiques relatives aux aliments
dans le traitement des maladies chirurgicales.



ARC 9 d. 2
n^o 7

Le Régime est une des choses les plus nécessaires
pour la guérison des Maladies Chirurgicales, et il n'appartient
qu'à ceux qui connoissent parfaitement la
Structure et l'usage des parties qui sont lésées,
de le régler comme il faut. *Lectures obs. de chirurg. Tome*
II. pag. 231.

Memoire dans lequel on tâche d'exposer
qu'elles sont Les regles dietetiques Relatives aux
alimens dans Le traitement des maladies chirurgicales.

L'abstinence ou l'usage ne fait jamais d'heureux. Volt.

Lanature toujours attentive à reparer Les pertes que subit
l'economie animale, ne se fait qu'à l'aide de certaines substances
aux quelles elle fait subir une infinité de changements dans Les
voies digestives, afin de les assimiler à nos parties, et de
conservées l'équilibre nécessaire pour que La santé ait lieu.
Ces Substances sont Connues sous le nom d'alimens et de
Bouillons, on en fait un usage journalier dans Le traitement
des maladies chirurgicales, et peu de Praticiens savent La
manière que L'on doit suivre dans Leurs prescriptions.

C'est dans L'intention de prévenir Les Abus que L'on
soumet journellement à ce sujet, que L'Académie toujours
occupée des progrès de l'art, a proposé d'importante questions
aux quelles j'ai eu tâche de répondre. Une me flatte
peut être de traiter une matière aussi vaste, de Manière à
Remplir ses vues, il faudrait pour Cela un praticien
consommé, et non un jeune homme qui a fait à peine Les
premiers pas dans la Carrière épineuse de la chirurgie.
Chirurgia non ingeni humani partes sed temporis filias.



Regles générales concernant La prescription
du regime dans Le traitement des maladies
chirurgicales.

Concedendum autem aliquam consuetudinem et temperantiam
et regionis et aetatis. Hipp. aph. 17. sect. 1.


Avant de prescrire Le regime à un malade, il faut
1^o s'informer de son âge.

2^o examiner quel est son tempérament.

3^o avoir égard au temps et au lieu.

4^o Demander quels sont Les alimens qu'il préfère
Ceux dont il fait usage habituellement, et en quelle

Monsieur



C'est point le desir de remporter le prix qui m'a fait
entreprendre le mémoire que j'ai adressé à l'Académie Royale
de Chirurgie, j'en ai présenté que comme une preuve de
mon Zèle. J'en rend justice et suis parfaitement
convaincu de la médiocrité de mon ouvrage pour le juger
indigne d'entrer en lice pour disputer le prix. une question
aussi étendue demande un praticien éclairé et non pas
un jeune homme, qui livré dans une province à l'oisiveté
deux années de malades pauvres, n'a pas été à même
d'observer.

J'ai l'honneur d'être avec les sentiments les plus Respectueux

Monsieur



Votre très humble et très
obéissant serviteur,


Auzerre le 15. ^{16e} 1778.

... chirurgien près d'Auzerre,

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper.



quantité il les prend ordinairement.
5^o examiner l'état des forces du sujet.

§ I.

il faut s'informer de l'âge. parce que les vieillards supportent très facilement la diète, ensuite les adultes, Les jeunes La supportent moins facilement que les adultes, et les enfans, surtout ceux qui sont très vifs, La supportent Les plus difficilement de tous. C'est ce qu'Hippocrate nous a enseigné dans l'aphorisme 13. de la 1^{re} sect. *senes facillime jejuniunt, Secundo qui in corpore sunt citate, minus adolentes, omnium minus pueri praesertim qui alio sunt alacriores.* voici les raisons qu'en donne le 1^{er} Vieillard qui cresunt plurimum habent calidi innati, unde plenior egent alimento, alioquin corpus absumitur; senibus autem parum calidi innati est, sic paucis egent alimentis, quia multis exstin guuntur, apho. 14. sect. 1.

§ II.

il faut examiner quel est le Temperament des Malades.
Les Tempéramens bilieux supportent plus difficilement la diète que les Sanguins, et ceux-ci moins facilement que les phlegmatiques. Les bilieux ayant les humeurs très acrimonieuses, ont besoin d'une réparation plus fréquente, sans quoi la chaleur qui règne chez ces individus les consumerait bientôt. Les Sanguins tiennent un milieu entre les premiers et les phlegmatiques, parcequ'il leur faut une certaine quantité d'alimens pour maintenir l'équilibre dans leur machine, enfin les phlegmatiques chez qui les forces vitales sont languissantes éprouvant peu de pertes, supportent facilement la diète.

§ III.

il faut avoir égard au temps et au lieu. on supporte plus facilement la diète dans un pays chaud et en été, que dans un pays froid et en hyver; dans les printemps on la supporte plus facilement que dans l'hyver, mais moins qu'en été et en automne. *Estote et autumnus cibos agerrime ferunt, hyeme facillime, ver secundum locum habet.* Hipp. aph. 18. sect. 1.

4^o il faut demander quels sont les alimens que le malade préfère, ceux dont il fait usage habituellement, et en quelle quantité il les prend ordinairement.

Cette considération est de la plus grande importance, sans elle le praticien inattentif ne sait quelque fois à quoi attribuer des accidens qui l'inquiètent dans le cours d'une maladie, tandis qu'avec une pénétrante réflexion, il en trouverait souvent la cause dans le régime du malade. Il faut donc lors même qu'on ait des malades, et que l'on se préoccupe de ce précepte donné par Hippocrate aph. 38. sect. 11. Cibus et potus paulo deterior, quamvis sit tamen melioribus quidem, sed minus gratus est praefereendus. quelque fois même on est obligé d'accorder à certains malades un régime qui est contre-indiqué par la nature de la maladie, Quae longo tempore assuevit sunt, quamvis deteriora, minus minus molestare solent. Hipp. Le docteur Alexandre

essais de médecine

d'Edinbourg

art. 46. T. VI.

pag. 27.

obs. I.

Mouro rapporte plusieurs observations qui viennent à l'appui de ce précepte. Je me contenterai d'en rapporter une.

Un homme s'étant cassé la jambe, on lui fit la réduction, et je lui ordonnai, dit Mouro, pour boisson ordinaire du lait coupé, de l'eau de gruau et choses semblables. Il ne dormit pas bien la nuit, le lendemain matin, je lui trouvai le pouls fort agité, et cependant petit; il avait soif, mal à la tête etc. Je m'imaginai que quelques excès que j'avais vus sortir de lui et lui, lui avaient donné quelques liqueurs fortes, et j'ordonnai en conséquence à des personnes sages que je pouvais compter, de veiller plus attentivement sur lui, et de le tenir à une diète rigoureuse. Il n'en trouva parmi eux la nuit suivante, ne dormit point du tout, et le lendemain matin je le trouvai avec le trismus, il était sorti de son lit, et avait jeté la boîte où on l'avait mis sa jambe; il avait des sautes d'humeur dans les yeux et ne connaissait presque personne, son pouls était aussi intermittent, et très concentré. Quel qu'un qui était près de lui, et que j'avais été un des plus parfaits yvrognes qu'il y eût dans la ville, m'assura que j'étais mon malade, si je ne lui accordais de la bière et de l'eau de vie, parce qu'il menait depuis plusieurs années une vie fort peu régulière. Je consentis à lui en donner un peu: la nuit suivante, il se trouva beaucoup mieux, et le lendemain matin il était absolument sans fièvre, sans délire etc., on m'avoua qu'il avait bu le jour précédent une quart de bière et un poisson d'eau de vie, ce qui lui avait procuré du sommeil et calmé le trismus. Il s'en tint à ce régime pendant tout le reste du traitement, et il guérit sans qu'il survint le moindre accident.

Quelque réflexion me doit par nous suggérer une pareille observation, et que de malheureuses victimes l'académie n'arrachera-t-elle pas des portes de la mort, en fixant les règles d'étiquette relatives aux alimens dans le traitement des maladies



Chirurgicales, et en déterminant la conduite de ceux qui ne
consultant par le pouvoir de l'habitude, veulent forcer la
nature à leur obéir.

Le chirurgien doit s'informer si le malade est gros mangeur
ou non. Les gros mangeurs ne subissent pas d'abord une
diète exacte sans éprouver des accidents, et c'est à tort
qu'on voudrait les y assujétir, si ce n'est dans certains cas
comme nous le dirons plus loin. La nature des aliments
dont le malade se nourrissait en santé, mérite la conside-
ration du praticien, un homme accoutumé à digérer des
aliments grossiers ne supportera pas aisément une diète si rigoureuse,
et l'on a souvent vu des gens se repentir d'avoir refusé des
aliments un peu plus nourrissants qu'ils trouvaient, des
tisanes.

Nous ne parlons ici que généralement, et nous donnerons plus
loin les restrictions convenables. Il faut seulement observer, avant
de permettre aux malades les aliments ordinaires contre-indiqués
par la nature de la maladie, si les accidents qui ont lieu ne dépendent
pas d'une autre cause, et si on doit les attribuer à la sévérité de la
diète, cela connu, on pourra se relâcher un peu sur le régime,
et si le malade se trouve mieux, on le laissera continuer.

Il faut examiner l'état des forces du sujet.

Considerare oportet, dit Hipp. aph. 9. sect. 1. an aeger possit cum
victu perdurare, donec morbus curset, et nimis praesens
deficiat et cum victu perdurare nequeat, aut morbus prius deficiat
et brevis est.

Les personnes épuisées par les excès, par de
longues maladies, et qui sont atteintes de quelque affection du
plessor de la chirurgie comme une plaie, fracture qui exigent les
plus grandes précautions relativement à la diète, ils ne doivent pas
être mis à un régime très sévère parce que l'économie
animale affaiblie, jus qu'à un certain point, ne peut
point d'être au-delà sans éprouver des désordres considérables.
Or chez ces personnes soit qu'une maladie exige quelque
opération, soit qu'elle n'en exige point, il faut considérer si
avec le régime qui conviendrait à tout autre, ils pourraient
supporter l'opération ou la violence de la maladie, enfin
maintenir l'économie animale dans un juste équilibre.

C'est en suivant ce précepte que M. Néaume, peut fort bien
troubler dans deux cas d'amputation où les sujets étaient trop
faibles pour supporter l'opération, et où les liquides étaient
dans un trop mauvais état pour fournir une bonne suppuration,
il leur a prescrit des restaurans quelque temps avant
l'opération et après, et ces uns leur ont une conduite

mémoires de
chirurgie.
pag. 348-350.

Aussi sage.

Je ne prétends pas que l'état de faiblesse de la machine ne soit très avantageux quand on veut faire une opération de conséquence, le ferait aller contre les préceptes des maîtres de l'art et mon affection pour moi d'ailleurs de mentir, parce que l'on observe à tous les jours que sur des sujets de la taille, des amputations suivies que les malades qui ont le plus souffert et qui ont été affaiblis par la violence de la maladie, guérissent plus sûrement que ceux que l'on a opérés dans un état de vigueur trop considérable; mais je dis seulement que même que dans ces derniers on pressent d'abattre les forces vitales par la saignée, la diète sévère, afin d'éteindre la violence des accidents qui suivent l'opération; de même dans les gens épuisés, on doit ranimer l'action vitale afin d'établir un état moyen toujours avantageux, et que les vrais praticiens seuls connoissent.

Deuxième Partie.



De la quantité d'aliments que l'on doit accorder aux Malades.

Avant de prescrire la quantité d'aliments que le malade doit prendre, il faut bien connaître le caractère et l'état de la maladie. C'est ici que se présente un champ vaste, c'est ici que brilleraient les observations et les réflexions d'un praticien éclairé. Mais à peine achevé cet ouvrage, et les difficultés que j'apprenais à chaque instant me font renoncer à tout faire à mon entreprise, et le sujet de ce m'instruire me fait continuer. Je l'ai donc caché d'écrire un peu dans cette seconde partie quels sont les cas où on doit asservir les malades à un régime sévère, et ceux où l'on doit accorder une certaine quantité d'aliments.

Des cas où l'on doit asservir les malades à une diète sévère.

Dans l'état de santé l'homme raisonnable ne prend d'aliments que ce qu'il en peut digérer. Dans l'état de maladie l'énergie des forces digestives doit être. La boussole qui nous guidera dans la prescription du régime, à l'exception des cas où quoique les forces digestives puissent opérer la coction d'une

Certainne quantité d'alimens, lependant nous prescri vons
un regime severe, soit parceque la nature de la maladie
exige la diminution des forces vitales. 2°. soit parceque les
organes qui reçoivent immédiatement les alimens ne peuvent
faire pour d'usage à cause de leur lésion. 3°. soit enfin parceque
le trouble qui existe dans l'économie animale, s'opposerait
à ce que la nature opérât une bonne digestion; alors les
alimens acquiescent des qualités de lésion, dans les premières
voies produiraient des acideurs qui rendraient la maladie
plus grave.

§ I.

Ce vous de vous diminuer les forces vitales par un regime sévère
toutes les fois que l'on soupçonne qu'il y a quelques gros vaisseaux
d'ouvert soit dans la poitrine soit dans le bas-ventre; sans cette
attention on s'expose à détruire le caillot salutaire que la nature
forme pour s'opposer à l'issue du sang, caillot qui résistera bien à de
légers contractions du cœur, mais qui se trouvera trop faible pour
peu qu'elles augmentent, et qui cedant à l'impulsion du sang donnera
lieu à une hémorrhagie mortelle. on doit tenir la même conduite
quand une playe qui fait un certain trajet dans un membre passe
près de quelque artère considérable, parcequ'en négligeant cette
circonstance, si les tuniques de l'artère ont été affaiblies, elles n'oppos-
ront point une résistance capable d'empêcher ^{leur} l'écoulement ou la
rupture. c'est surtout dans les cas de playe d'armes à feu, qui
portent leur action profondément, qu'il faut être sur ses gardes. dans
l'ouverture des artères des extrémités, si on s'est servi de la
compression des astringens pour s'opposer à l'hémorrhagie, il faut
affaiblir les malades; si on s'est servi de la ligature, il faudrait
au contraire se relâcher un peu du regime, afin de faciliter le
passage du sang dans les vaisseaux de communication.
Dans les anévrysmes du Cœur, de la Base de l'Aorte, des carotides
dans leur partie inférieure, des sous-clavières, enfin dans tous les
anévrysmes internes, il faudra affaiblir le malade par l'adite
sans quoi, on l'exposera à des ruptures spontanées et à la mort;
on doit appliquer ce principe aux anévrysmes vrais externes quand
la possibilité de la diminution des malades les empêche de se soumettre à
l'opération.

Je vais rapporter quelques observations qui prouveront l'importance
du régime que je viens d'établir, puis je son omission a fait écrire les
détails qui en font le sujet.

obs. 11.

un domestique d'environ 36 ans, d'un tempérament sanguin,
mourut le 21 avril 1772 à la partie moyenne supérieure d'un peu
latérale droite de la poitrine, un coup d'une pierre que

Journal de
Médecine 960
1776. mai -
M. J. J. J. J.

Donnons-le Carrelats : aussitôt il tomba dans une syncope qui
dura deux heures ; il fut saigné une fois dans la journée ; le lendemain
il entra dans l'hôpital de la charité ; il avait le pouls petit, se plaignant
d'un sentiment de pesantement qu'il rapportait à la partie antérieure
de la poitrine, la respiration n'était pas gênée. on fit usage des
topiques résolutifs pour dissiper les vers de la poitrine qui étaient
devenus, on donna à médication fort épaisse. Le 3^e jour le sentiment
de pesantement diminua ; le 4^e il disparut entièrement ; le pouls avait
 repris son état naturel ; le 5^e il était tranquille et commença à
prendre une petite nourriture ; dans la matinée du sixième il était
gai, riant, lors que tout à-coup il se sentit faiblir, se jeta sur
le côté, étendit les bras pour prendre un pot à l'eau sur la
table de nuit, pour se rafraîchir et expira. à l'ouverture du
cadavre, on trouva de gros caillots de sang dans les ventricules, et
à l'ouverture de la cavité du ventricule gauche d'une pellicule
grasse et triangulaire.

De la dissection
morb. ep. 93.

On a gagné rapporte plusieurs observations de personnes qui ont
vécu plusieurs jours quoiqu'ayant des plaies au cœur et qui soient
mortes au moment où on s'y était endormi ; et il dit que ces personnes
n'ont survécu si longtemps que parce que les plaies étaient petites et obliques
et remplies par des caillots, qui s'étaient opposés à l'issue du sang, et
parce que les parois du cœur ne devenant fuyantes - mêmes s'étaient
diminuées l'étendue de la plaie.

obs. III.

Caviard dans sa 113^e observation dit qu'on apporta à l'hôtel dieu
un homme de 26 ans qui venait de recevoir un coup d'épée entre
la 3^e et la 4^e des vraies côtes, comme il était très faible, on ne
voulut pas lui faire l'opération de l'empyème, quoiqu'il eût une
très grande difficulté à respirer, parce que l'on s'imaginait
qu'il allait expirer à chaque instant ; cependant il vécut quatre
à 5 jours après sa blessure. à l'ouverture de la poitrine on
trouva que le cœur était percé de part en part, le sang ayant
passé du ventricule droit au ventricule gauche à travers la
cloison, au moyen de quoi le sang avait rempli la cavité de la poitrine ;
de manière que le blessé n'avait vécu pendant ces 4 à 5 jours qu'à
l'occasion de quelques grumeaux de sang qui avaient bouché les plaies
des ventricules.

obs. IV

On a dit dans la 243^e observation de Lamotte, qu'il fut appelé pour
voir un particulier qui venait de recevoir un coup d'épée à 4 doigts
au-dessous de l'ombilic. il sortait une grande quantité de sang par la plaie.
Ce qui lui fit juger qu'il y avait quelque gros vaisseau ouvert, et
aussitôt il regarda le malade comme mort. il le pansa avec un
bandage de corps et mit une cerise dans l'ouverture, il tira la
tente au bout de quelques heures et il sortit beaucoup de sang sans
que la tumeur du ventre parut diminuer ; il continua de faire



La même chose jus qu'au 3^e jour que le malade mourut. à l'ouverture du cadavre, il trouva la veine cave percée comme par une lancette.

Obs. V.

M^r Trévart rapporte dans ses mémoires de chirurgie p. 324. qu'un capitaine de brussards Recut un coup de feu au bras. La balle avait son entrée à la partie postérieure du Muscle Deltoides et elle fut tirée par une contre-ouverture à la partie interne d'environ Moyenne du bras. après les dilatations nécessaires, on regarda la playe comme simple et le malade comme fort heureux de n'avoir pas eu d'artère axillaire endommagée. Le malade fut mis à un régime sévère. la playe faisait tous les jours des progrès rapides vers la guérison, au point qu'on ne la pansait plus que tous les deux jours. L'après du 18. au 19^e jour de sa maladie, on courut chercher le chirurgien major, qui s'étant rendu chez le blessé, le trouva baigné dans son sang. il leva l'appareil et reconnut la source d'une hémorrhagie, qu'il prétendit être à l'axillaire même, enfin quel que mouyts que pussent être des veines qu'il lui donna, le blessé mourut entre ses bras. Le domestique de cet officier apporta au chirurgien, que son maître avait soupe avec deux de ses camarades, qu'il avait mangé un poulet, l'appât d'un gigot, et avait bu à peu près une bouteille de vin. C'était le premier repas que cet officier eut fait depuis sa blessure.

De toutes ces observations je suis en droit de conclure qu'il ne faut jamais désespérer des playes du cœur, des gros vaisseaux situés dans la poitrine, le bas ventre, au col, ~~aux~~ et dans celles des artères axillaires, quand elles sont petites et que le malade est tombé en syncope après avoir reçu le coup, pourvu que respectant cet état pendant lequel le sang se coagule et propre à fermer l'ouverture, on n'aille point inconsidérément ranimer le malade, et donner lieu à une nouvelle hémorrhagie; il faut donc laisser de vin le blessé peu à peu, il sera la vérité très faible, mais cette faiblesse est avantageuse. puis que les contractions du cœur étant alors peu considérables, ne formeront pas l'obstacle qui s'oppose à l'issue du sang; Bien plus, il faut l'entretenir pendant un certain temps, et ne pas s'enlaiser en proposant les apparences de mieux, qui ont induit en erreur dans le cas qui fait le sujet de la 2^e obs. si l'épanchement de sang était considérable au point de menacer de suffocation, soit qu'il eût lieu dans la poitrine ou dans le bas-ventre, par l'adifficulté que le poulmon trouverait à se dilater dans les premières cas, parce que le sang occuperait une étendue considérable de la cavité de la poitrine; dans

Dans le second parce que le diaphragme soit de force pour la vitrine;
on pourroit donner issue dans l'un et l'autre cas à une quantité de
sang suffisante pour rendre la respiration moins gênée, soit par la
soit en pratiquant la paracentèse de la poitrine ou du bras-ventre.
Je suis persuadé que dans le cas de l'apoplexie par l'aviare, on pourroit
pu réussir en suivant le précepte, et dans l'observation de la note
de l'auteur auroit pu avoir lieu, si cet habile chirurgien, n'eût pas
donné issue au sang si souvent, et si l'on s'était par persuadé en
voyant le malade qu'il en mourrait.

Quand on soupçonnera la lésion d'une artère d'une extrémité
située dans le voisinage d'une playe, il faudra tenir le malade à une
diète rigoureuse, le faire surveiller, lui annoncer à quoi il s'expose
afin d'éviter la terrible catastrophe d'un hémorrhage de la veine. On
peut encore faire une légère compression sur le trajet de l'artère
au-dessus de la lésion, afin de diminuer la force d'impulsion du
sang, dans le cas où le malade est dans une certaine vigueur,
on prescriera des bouillons de ténus entiers, de l'aide d'eau, de
poulet, de l'aide d'orge peu chargée de deux heures en deux
heures, observant toujours l'état du pouls, afin de le supprimer
pourvu qu'il s'élève.

il suffit qu'ayant manqué à ces précautions le malade soit
mort, pour que nous les ayons dans des cas semblables. Le blessé
pourra périr, mais le praticien n'aura rien à se reprocher
puisque il se sera conduit suivant les principes de l'art, et dans
de pareilles circonstances nous devons toujours nous rappeler
l'observation de la guérison d'une playe à l'artère axillaire
rapportée par dans Wielen T. I. § 161. guérison qui ne fut
obtenue, que par l'état apparent de mort où le blessé resta longtemps
et pendant lequel se forma le caillot qui se consolida par sa texture
parce que le blessé resta longtemps dans un état de faiblesse
extrême. præter omnium opinionem diu in summa tali debilitate
manens vulneratus exivit tandem.

Quant aux personnes qui ont des anévrysmes inaccessibles à
nos instruments, il faut les mettre à un régime sévère, leur
défendre tous les exercices, s'ils veulent vivre, leur longtemps, sans
quoi ils seront exposés à périr subitement par la rupture de la
poche anévrysmale. D'ailleurs si l'on trouve un malade
courageux, on pourroit tenter le moyen qui a réussi à
Valsalva dans un cas pareil, le moyen est d'affaiblir par la
peu le malade, jus qu'à ce qu'il ne lui reste qu'une souffle de vie,
et de le rappeler de cet état par l'opacation.

§ II.

Vous devez prescrire un régime sévère dans le cas où les organes
destinés à recevoir les aliments ne peuvent se faire sans danger
pour les blessés parce que leur continuité est lésée, c'est ce qui a
lieu dans les playes de la portion d'œsophage ou fermée



Morgagni de
fœ. d. l'au. Mo.
ib. Epist. 17.
§ 30.

méthod. chirurg.
n.º 43. § 619.

obs. VI.

Dans la poitrine, Del'estomac, Des intestins, Dans les premiers cas
quoique très rare, parcequ'il n'est gueres possible quel'écoulement
soit de l'effe seul, on s'exposeroit à un épanchement dans la poitrine,
et dans le second dans le bas-ventre, on ne doit accorder que
quelques cuillères de bouillon; et insister sur les lavemens qui
pourront soutenir les malades jusqu'à ce que les playes soient guéries,
puis que Platner rapporte qu'un me Religieux qui ne pouvoit
rien avaler veint pendant 66 jours, l'au moyenn des lavemens
nutritifs, on accorda de temps en temps une tranche d'orange
~~avec du sucre~~ afin d'appaiser la soif qui tourmentoit
ordinairement les malades. Ladite diète doit être non seulement
observée dans le cas de playe à l'estomac, mais encore être
continué pendant un certain temps. voici une observation qui
prouve combien on expose les blessés en leur accordant d'aliments.

M. De Mainleville fut appelé pour voir un jeune homme
qui venoit de recevoir un coup d'épée à la région épigastrique,
il reconnut que l'estomac étoit percé d'un part en part; le jeune
homme vomit naturellement, les playes furent lavées comme je l'ay
dit, il fut fait régime et mis à la diète, jusqu'au 7.º jour le malade fut sans
fièvre, sans accidens, les playes extérieures étoient presque cicatrisées,
enfin tout annonçoit une guérison prochaine; quand on s'avis a de
donner au blessé à l'insu du Chirurgien qui faisoit toujours
continuer la diète, une Rôtie au sucre, une boisson plus
abondante, des Bouillons et même des potages. la fièvre
survint, le ventre qui jusques là avoit toujours été
très mou, devint tendu, la respiration très difficile,
accompagnée d'un toux sèche, d'un ergasme et de l'expectation
et malgré ce que l'on put faire, les accidens augmentèrent
à un tel point que le malade mourut le 10.º jour de la
Blessure, à l'ouverture du bas-ventre on trouva
l'estomac percé en deux endroits, et un épanchement de
matière chyleuse mêlée de bile.

Le malade ayant veu 7 jours sans accidens, il y avoit de
croire que si l'on avoit encore observé pendant quelques jours
le régime convenable, le malade auroit été guéri. Les
forces étoient suffisantes pour soutenir encore pendant quelques
jours cette abstinence, pendant lesquels les playes de l'estomac
se seroient réunies.

§ III.

Quand le trouble qui existe dans l'économie animale
s'oppose à la digestion, il faut mettre les malades à
une diète sévère, jusqu'à ce que la violence des accidens ait
disparu les aliments que l'on donneroit alors au malade lui
seroient très pernicieux, parceque la digestion ne s'opérant
qu'imparfaitement, on verrait la fièvre augmenter,

la suppuration disparaître, ou ne point avoir lieu; D'où
Les métastases, et la mort. Dans les maladies chirurgicales
inflammatoires, après les grandes opérations, celles que La
lithotomie, l'amputation d'un membre, d'une carie nose,
d'une testicule &c &c nous devons mettre les malades à une
diète sévère, jusqu'à ce que la suppuration soit bien établie
et qu'il n'y ait plus de fièvre, sans cette précaution, on exposera
les malades à périr. Voici une observation qui prouve ce que
j'avance.

obs. VII.

Un soldat eut ses mains emportées en chargeant un canon
mal équilibré, il fut porté à l'hôpital, où M. Trécourt lui
fit l'amputation de deux bras, le 6^e jour tout allait à
merveille, et la suppuration commençait à s'établir; un
soldat de sa compagnie, qui fut envoyé pour le veiller, s'avisant
d'être de sa poche un morceau de pain de munition, le donna
lui en cachette, et il lui en donna, le lendemain M. Trécourt
le trouva avec beaucoup plus de fièvre qu'il n'en attribua à la
suppuration; et les plaies des moignons s'étant trouvées sèches,
il se donna de quelques fautes dans le régime, et il éprouva celle
qui avait été commise. Il lui prescrivit une boisson délayante, mais
dans la journée de lassitude qu'il prit d'un voyage qu'il emporta
en 24 heures, il n'eut point d'opération qui ne pût servir de
exemples semblables.

Dans tous les cas que nous venons d'examiner, on ne doit point
permettre d'aliments solides aux malades, mais leur accorder de
légers bouillies pris en petite quantité, de l'eau de veau, de
poulet, de l'eau d'orge que si elle n'est trop, s'il le faut
supporter une pareille diète, il faudrait seulement lui permettre
quelques cuillerées de vin dans la journée.

Des Cas où l'on doit accorder une certaine quantité d'aliments aux malades.

Vous venons d'examiner quels sont les cas où le régime doit être
sévère, il s'agit maintenant d'indiquer ceux où l'on doit accorder
une certaine quantité d'aliments aux malades.

Dans les circonstances différentes de celles que nous avons
détaillées plus haut, c'est à dire où l'on ne craint point
qu'une hémorrhagie spontanée enlève le malade, où l'asphyxie
et l'estomac ne sont point blessés, où le calme a succédé à
l'orage qui nous avait obligé de prescrire une diète rigoureuse,
quand le malade est sans fièvre, qu'il a envie de manger,
il ne faut jamais lui en refuser, parce que c'est ce qu'il faut
s'opposer à la guérison. (1) et quel que fois on expose la

(1) voir M. Trécourt L. c. n. 344 346. 355. 356.) rapporte
plusieurs observations de fractures de la jambe et du bras, dans des



Le malade à périé dans le marasme (1).

Dans ces cas il faut accorder des aliments, mais en petite quantité, parce qu'un estomac qui a resté 8. 15. jours & plus sans digérer, quedes brouillours, de latifame, ne pourra point / le chaux opérée l'adigestion d'une certaine quantité d'aliments, & de l'indigestion qui s'en suivrait donnerait lieu à la fièvre au dévoiement, aux métastases, aux deux trop, commun à ceux qui passent tout de suite d'un extrême à l'autre, on permettra d'abord un petit potage, ensuite du soup, avec un peu de vin, on augmentera peu à peu, afin d'en venir par peu chargé de l'estomac, et de lativement à l'abondance de la suppuration. J'edis de l'abondance de celle-ci, parce qu'elle est aussi nuisible que d'être trop petite quantité. Combien de fois n'est-il pas arrivé qu'elle ait pris un mauvais caractère par le défaut de nourriture et dans un cas rapporté par M. Crévier d. c. p. 350. on voit qu'un officier blessé par un boulet qui lui brisa les os du Corps, et réduisit dans un état si désespéré, qu'on n'osa point lui faire d'amputation du bras, réduisit sa guérison et la conservation de son membre qu'à la garde qui l'avait de lui donner du soup avec dans four bouillon dans la nuit du 16 au 17. de mai. Le lendemain on trouva la plaie en meilleur état, le chirurgien attribua ce mieux à une portion Cordiale qu'il en avait prise vite, mais l'officier n'en avait point pris, il ordonna de la continuer, le malade n'en prit point encore et éprouva de sa garde une nourriture semblable le jour suivant et la nuit, la plaie se trouva encore dans un meilleur état que la veille, et le blessé ayant avoué Ce qu'il avait éprouvé de sa garde au chirurgien, celui-ci lui accorda un peu plus d'aliments, et par cette Cordiale la guérison fut opérée.

Des Sujets font guérir d'ailleurs, où le calme a commencé à se former, que quand on leur accorde une certaine quantité d'aliments aux malades, qui avaient subi une diète d'un mois, de plusieurs semaines sans apparence de consolidation dans le cal, et qui ont été promptement guéris en changeant la manière de vivre. Ce précepte doit être suivi aussitôt des hernies avec gangrène quand on tente de réduire ou de se boucher d'intestins, afin d'éviter de se rétrécissement du canal intestinal dans cet endroit, de se rétrécissement qui expose le malade à périé pour peu qu'il s'affaiblisse dans le régime. voy. me Louis.

(1) me Crévier d. c. p. 347. av. un homme à qui l'on fit l'extirpation d'un os ostéite, périé à la suite de la diète rigoureuse qu'il s'était lui-même imposée, ne voulant prendre autre chose qu'un brouillon et de l'eau.

Obs. VIII.

Dans la circonstance que nous examinons, il vaut mieux prescrire par un peu d'exercice que par une trop grande abstinence, Cemius victus et exquiescit ut plurimum periculosior est paulo plenus. Hipp. opht. 3. lib. 1.^{er} et dans le cas où la suppuration serait trop abondante, il faudrait épargner au tant d'éminuer la quantité d'aliments, si elle ne provient pas d'un pausement peu méthodique.

Troisième Partie.

De la Nature des aliments qui Conviennent dans le traitement des Maladies chirurgicales.

Le grand Nombre de Maladies sur lesquelles la Chirurgie étend son domaine, ne nous permet pas de les parcourir chacune en particulier afin de faire observer la différence du régime dans chacune d'elles. Cette entreprisa est au delà de mes forces; aussi me contenterai-je de décrire toutes ces maladies relativement à l'état des fluides et des solides sous quatre classes générales et comme les aliments que nous prescrivons doivent tendre à corriger ou à détruire, conjointement avec les remèdes, le vice existant dans l'économie animale, nous espérons que cette division ne déplaira point à l'académie.

Dans toutes les maladies chirurgicales où il y a épaisseur, pléthore vraie ou fautive; ou épaissement dans les fluides et détachement dans les solides; ou dissolution putride dans les humeurs et extinction dans les solides; ou enfin fluxion dans les solides et abondance de croûte dans les fluides.

§ I.

La Pléthore vraie ou fautive alien dans les maladies chirurgicales inflammatoires, dans les cas de fracture, de luxation, après les grandes opérations. Les aliments solides doivent être prescrits, et on mettra les malades à l'usage des boissons delayantes, anti-phlogistiques, n. g. l'eau de veau, de poulet, le petit lait, les ynges de groseille, de quinquina étendus dans une suffisante quantité, et on les fera continuer jusqu'à ce que la fougue des acides ait disparu.

§ II.

Dans le cas d'épaississement dans les fluides et de Relâchement dans les solides, ce qui constitue des maladies chroniques chirurgicales, telle que le rachitis, les scorbutiques, enfin dans toutes celles où le but du chirurgien est d'effondre et d'atténuer, on doit insister sur le régime, et le combiner, le changer afin que les malades ne soient pas incommodes, pour peu qu'ils s'écartent de celui qu'ils suivent ordinairement; il est souvent utile d'y mêler un peu d'exercice dans l'usage d'aliments et des liqueurs fermentées, pour exciter dans l'estomac une action plus vive et une révolution qui devienne salutaire en détruisant des évacuations qui entraînent au dehors des humeurs viciées. enfin dans certains cas, il ne faut pas trop insister sur le même régime, s'il ne produit pas un effet avantageux au bout d'un certain temps. On retire souvent plus d'effet des aliments qui nous paroissent être directement opposés à ceux qui nous paroissent les mieux indiqués,



27 et qui nous ont servi aussi dans des Cas semblables, parceque des modifications
27 tiores des parties irritables repart par les mêmes dans tous les Sujets. J'observe
enais de physiologie p. 304 et suiv. Les aliments qui doivent être préférés
alors sont les viandes de bon suc et de facile digestion, les dragées
épices, les confitures aromatiques, le bon vin, parcequ'ils aug-
mentent l'action des solides et facilitent l'action des remèdes
appropriés.

(1) pourvu que des engorgemens soient anciens, car lors que l'obstruction
est parfaite, elle ne se dissout pas et n'est plus susceptible que de la
terminaison ou par fonte putride, ou comme cette terminaison est
desavantageuse, quand l'obstruction est dans le bas-ventre, dans la
poitrine, il faut prendre garde de ne pas trop, et s'efforcer des malades, et
s'opposer seulement à ce qu'elle n'augmente pas.

§ III.

Quand il y a été mis dans les solides et dissolution dans les fluides,
comme il arrive dans le dernier degré du scorbut, de la verole, des
scrophules, du Malin, etc., les malades se plaignent d'une chaleur
à cre qui augmente pendant la nuit, parcequ'alors les mollicules
acrimonieuses sont plus exaltées, et qui se fait connaître à celui qui
touché la peau. Cette dernière est sèche, aride, et la transpiration n'y
fait point mal ou pas du tout, l'humidité de cette opération se sent dans
le torrent de la circulation et augmente le mal. C'est l'état où l'on
trouve ceux qui sont atteints d'apoplexie, d'ulcères véné-
rieux, scorbutiques, scrophuleux, cancéreux; quand les engorge-
mens qui courtoient les premiers degrés de ces maladies sont
tombés en fonte putride, soit parcequ'on a trop échauffé la machine
animale par l'usage immodéré des fondans, administrés cependant
à temps pour obtenir leur dissolution; soit parceque persuadé de la
possibilité de résoudre une si dure, une tumeur scrophuleuse ou
toute autre obstruction, on aura commencé l'usage des fondans
non seulement trop tard, mais encore avec trop peu de ménagement;
C'est ce que l'on voit arriver tous les jours aussi et du scorbut que des
ignorans veulent résoudre, non seulement ils n'y parviennent pas
mais ils augmentent le mal en donnant lieu à la décomposition des
sucs de la tumeur, et en faisant dégénérer en cancer, une tumeur
que les malades pouvaient porter longtemps sans en être beaucoup
incommodés.

Les vrais praticiens exempts de préjugés, voyent avec peine administrer
sans aucun jugement des sucs de Bresson, du grand et des autres ma-
lheureux scorbutiques tout couverts d'ulcères et consumés par une chaleur
qui les pousse souvent des douleurs du sommeil, ils ne sont pas surpris de le
voir périr, tandis que ceux qui pressent et veulent ces remèdes persuadés
de leur vertu spécifique, ne peuvent comprendre comment la chose
s'est passée, phénomène bien facile cependant à expliquer, si l'on
faisait attention que dans l'état de putréfaction où la machine ne se
trouve, c'est augmenter le mal que d'augmenter la chaleur.
Déjà trop considérable, par des remèdes irritans. il en est de même
de la verole, du Malin, des scrophules parvenues au dernier degré,
quand on veut les combattre dans cet état par les remèdes échauffans
regardés comme spécifiques de ces maladies. J'en ai prétendu par expérience
les bons remèdes que l'expérience a démontré, plus tôt connus.

Dans certaines maladies que dans d'autres, mais seules qu'on ne peut pas
 la circonstance que nous examinons, on doit employer les remèdes propres
 à résister à la diathèse putride, et certainement l'enferme par les anti-ve-
 néreux ordinaires dans le cas de l'écoulement de l'urine, de la sueur, de la salive,
 Le régime doit être le principal moyen de guérison, et celui par lequel
 on doit insister d'avantage, les malades doivent être mis à la diète
 végétale, et l'indication qui se présente est de rendre aux fluides des leu-
 cocytes et leur consistance, aux solides leur cohésion et leur force; elle ne
 peut être remplie qu'en rendant à ces substances l'air fixe qu'elles ont
 perdu. Les végétaux contiennent une grande quantité d'air et fermentent
 très aisément avec des substances animales. pendant cette fermentation
 qu'ils subissent dans les premières voies, ils laissent échapper l'air fixe
 qu'ils contiennent, cette vapeur d'une activité étonnante est absorbée
 par les vaisseaux intralés, et pénétrant dans les autres, elle se combine
 à la putréfaction, suspend les progrès de la putridité ou la corrige.
 Deboissière folles anti-septiques, p. 47. outre cela ces aliments doivent
 être mis sous les molécules aériennes, afin de diminuer leur pression sur
 les solides et de faciliter leur issue par les voies urinaires. Les
 aliments qui possèdent ces qualités sont les farineux ceux qui abondent en
 principes aqueux, mucilagineux, les végétaux à grains, les fruits acidules;
 Les boissons sont l'hydromel, la petite bière, l'eau d'orge ayant la
 précaution de les prescrire en petite quantité et souvent afin d'en pro-
 fiter de l'estomac. quand on aura remédié à la diathèse putride, on
 arrêtera ses progrès, on associera aux aliments et aux boissons prescrites
 ci-dessus les bons remèdes propres à combattre la maladie.

§ IV.

L'état de l'écoulement qui nous reste à examiner est celui de l'écoulement dans les solides
 et d'abondance de la sueur dans les fluides, et état se rencontre chez ceux qui sont
 atteints d'hydropisie, d'œdème, d'ascite, de la suite des grandes hémorrhagies,
 ou d'un grand nombre de saignées faites pour un ulcère ou pour une maladie
 aiguë quelconque. les aliments qui doivent être employés sont les viandes, rôties,
 bouillies, les sautés, les confitures aromatisées; Les boissons seront
 peu abondantes et le bon vin sera seul permis. enfin les maladies peuvent
 être rangées sous la § III.

Ces quatre états peuvent être combinés entre eux, et alors c'est au
 praticien éclairé à examiner quel est le vice dominant afin de combattre
 la maladie avantageusement en associant les remèdes propres à chaque
 partie de la complication. C'est ainsi par exemple qu'on associe au
 commencement de la fonte putride dans le scorbut, on associe avec
 les anti-septiques irritants avec les aliments susceptibles de
 fermentation afin de s'opposer à la décomposition des aliments
 encore existants, et corriger la putridité des humeurs qui ont déjà
 subi la fonte putride. on peut encore autant de la source des
 Prokites.



Du Regime dans la Convalescence.

La Convalescence est cet état moyen entre la maladie et la santé. un chirurgien ne doit point abandonner un convalescent et le laisser vivre à sa fantaisie, il doit lui assigner un régime conforme à l'état de son estomac et à la maladie dont il l'a guéri; sans quoi, il peut exposer à la voir renaître, ou bien en combattre une nouvelle, dont la cause sera le mauvais régime que le convalescent aura gardé.

obs. IX.

Jabard pag. 162. rapporte que le mauvais régime qu'il observa dans sa Convalescence une femme qui avait deux mois après l'opération de son ventre avec effusion d'intestins et d'hyperplonie, donna lieu à un flux d'entre 14 jours après l'entière guérison des playes, qui l'enleva en peu de temps. La plupart des praticiens ont été dans le cas d'observer la même chose, un convalescent doit donc prendre grand soin de s'alimenter à la fois, afin d'éviter par ses repas aux indigestions qui peuvent avoir des suites les plus funestes. quelquefois malgré les précautions les plus sages s'établissent par une raison d'aliments quel'on mange, alors il faut faire attention si le convalescent ne mange pas trop, si cela est on diminuera la quantité de nourriture; si cela n'est pas, il faudra purger le convalescent lui prescrire quelques médicaments in usum, d'exercice, et les bains tempérés, dont M. Denonart Doyen de la Faculté a tiré les plus grands avantages dans les Convalescences difficiles. voy. J. Denonart. octobre 1776.

fin

A Amsterd. Le 15 Decembre 1778.